

گوش درد :

گوش درد می تواند بطور اولیه در همان ارگان (اختلال در گوش) مثل عفونت یا از جای دیگری منشأ گرفته باشد (اختلالات خارج گوش)

گوش درد می تواند نتیجه عفونت در گوش خارجی یا میانی و یا صدمه به گوش و سر باشد . گوش درد ارجاع شده از مکانهای دیگر می تواند توسط اختلالات در مفصل فک گیجگاهی ، اعصاب مغزی ، صورت ، پوست سر ، حلق و لوزه ها ، تیروئید ، نای ، دندان و یا عضلات گردن بوجود آید .

علت :

گوش درد می تواند باعث عفونت در گوش خارجی و میانی ایجاد شود . آلودگی های باکتریایی می تواند از طریق مواد زائد

آلوده وارد گوش شود . بعنوان مثال انگشتان یا اجسام .

ورود اجسام تیز به گوش می تواند پوست را مصدوم کرده و راه بازی را برای عفونت تأمین کند . تزریق یا ورود محلولهای آلوده به گوش عفونت و التهاب را افزایش می دهد . ابتلا بیماران به عفونت های تنفسی فوقانی ، عملکرد نامناسب

شیبور استاش و آلرژی ها نیز خطر عفونت های گوش را افزایش می دهد .

عفونتها و بدخیمی های حلق نیز می تواند باعث گوش درد ارجاعی شود .

برای بیماران مبتلا به عفونتهای حاد لوزه ، گوش درد غیر معمول نیست ولو اینکه گوشها در معاینه نرمال باشند .

انسداد حاد ناشی از تغییرات ارتفاع که باعث پرواز یا زیر آب رفتن ایجاد می شود ، می تواند باعث اختلالات گوش میانی گردد .

درمانهای اکسیژن پرفشار نیز می تواند باعث ایجاد آسیب ناشی از فشار شود . مثلاً در مسمومیت با منوکسید کربن .

درد نواحی فک ، گیجگاهی ، لته و دندان ، دهان و ماهیچه گردن می تواند باعث ارجاع درد به گوش شود . درد مفصل بعثت سائیدن دندانها بهم ، جویدن و زیاد حرف زدن بوجود می آید و التهاب این مفصل برای بیمار به صورت درد گوش احساس می شود .

استرس و فشار روی ماهیچه های گردن می تواند به گوش منتقل شود .



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی درمانی خلیلی

گوش درد

کد سند : f-1/3/3-56

واحد آموزش سلامت

۱۴۰۲

مداخلات پزشکی شامل :

- بهبودی (شستشوی گوش و مصرف آنتی بیوتیکها)
- تسکین درد
- برگرداندن عملکرد طبیعی گوشها



منابع :

- س . اسملنزر . پرستاری داخلی و جراحی برونر و سوارث . ترجمه : م . ایمانی پور . چاپ نخست . انتشارات اندیشه رفیع . ۲۰۱۰
- بازبینی توسط اساتید گوش ، حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی خلیلی
- بازنگری : ۱۴۰۲

عوامل ایجاد درد گوش :

- صدمه به گوش خارجی مانند بریدگیها ، صدمه غیر نافذ ، سوختگی ، سرمازدگی .
- ورود اجسام خارجی : که گوش درد ناشی از انسداد در کانال گوش و ایجاد فشار می باشد که ممکن است فرد احساس کاهش شنوایی ، احساس پری و خارش در گوش داشته باشد .
- اختلالات شیپور اوستاش .
- عفونتها که شامل عفونتهای گوش خارجی ، عفونتهای گوش میانی ، عفونت پرده گوش و عفونت استخوان مستوئید (پشت گوش) می باشد .
- وجود توده ها در کانال گوش خارجی مانند کیستها ، آبسه و توده های بدخیم .