

التهاب کبد ویروسی ، عفونت ویروسی است که در آن نکروز و التهاب سلول های کبدی ، دسته ای خصوصیات بالینی ، بیوشیمیایی و تغییرات سلولی را ایجاد می کند .

تا امروز ۵ نوع مختلف التهاب کبدی ویروسی که بیماری کبدی ایجاد می کنند شناخته شده است : هپاتیت (التهاب کبدی) E.D.C.B,A .

هپاتیت ویروسی A

هپاتیت A که قبلاً هپاتیت عفونی نامیده می شد به علت RNA ویروس خانواده انتروویروس ایجاد می شود .

این شکل هپاتیت ابتدا از راه مدفوعی-دهانی ، با خوردن غذا یا مایعات آلوده به ویروس منتقل می شود .

هپاتیت A می تواند در طی فعالیت جنسی منتقل شود .

هپاتیت A از طریق انتقال خون منتقل نمی شود .

تا کنون ، به ندرت از راه تزریق خون منتقل شده است .

دوره کمون بین ۲ تا ۶ هفته و به طور متوسط حدود ۴ هفته تخمین زده می شود .

دوره بیماری ممکن است طولانی بوده و بین ۴ تا ۸ هفته طول بکشد .

در افراد بیش از ۴۰ سال ، معمولاً طولانی تر و شدیدتر است . غالباً بیماران بر هپاتیت A فائق آمده ، ندرتاً به نکروز حاد کبد یا نارسایی کبد حمله ای که نتیجه آن سیروز کبد یا مرگ است ، منجر می شود .

تظاهرات بالینی :

بسیاری از بیماران ممکن است زرد نشده (بدون زردی) و فاقد نشانه باشند . زمانی که نشانه ها ظاهر می شوند ، ممکن است خفیف ، شبیه آنفولانزا ، عفونت دستگاه تنفس فوقانی ، با تب خفیف باشند . بی اشتها ، به عنوان علامت اولیه ، غالباً شدید است .

در مراحل بعدی زردی و ادرار پررنگ ممکن است رخ دهد . سوء هاضمه در دو حالت مختلف وجود دارد که حالت تهوع ، سوزش سردل و نفخ مشخص شود .

بیمار ممکن است حالت نفرت از طعم سیگار یا بوی سیگار و سایر بوهای تند داشته باشد .

هپاتیت ویروسی B

برخلاف هپاتیت ویروسی A ، هپاتیت ویروسی B به طور اولیه از راه خون (از راه پوست و غشاء) منتقل می شود .

ویروس هپاتیت B را می توان در خون ، بزاق ، مایع منی ، ترشحات واژن پیدا کرد و می تواند از راه لایه های غشاء و پوست آسیب دیده منتقل شود .

همچنین ویروس هپاتیت B می تواند از مادران ناقل به جنین هایشان منتقل شود .

عفونت معمولاً از راه ورید نافی منتقل نمی شود ، اما در زمان تولد و در طی تماس نزدیک پس از آن منتقل می گردد . هپاتیت ویروسی B ، دوره کمون طولانی دارد .

این ویروس در کبد تکثیر شده و در سرم برای مدت نسبتاً طولانی باقی مانده و فرصت انتقال به ویروس داده می شود .

تظاهرات بالینی :

علائم و نشانه های هپاتیت B ممکن است پنهانی و متفاوت باشند . تب و علائم تنفسی ممکن است نادر باشد .

بعضی از بیماران درد مفاصل و ضایعات پوستی دارند . بیمار ممکن است اشتهای خود را از دست بدهد و سوء هاضمه ، درد شکم ، درد عمومی بدن ، کوفتگی عضلات و ضعف داشته باشد . زردی ممکن است رخ دهد ، مدفوع با رنگ روشن و ادرار پررنگ با آن همراه است .

هپاتیت ویروسی C

این نوع هپاتیت از طریق خون و تماس جنسی منتقل می شود .

افرادی که در معرض خطر هپاتیت C هستند شامل مصرف کنندگان مواد مخدر به صورت داخل وریدی و تزریقی ، افرادی که فعالیت جنسی با شریک جنسی متعدد دارند ، بیمارانی که متناوباً خون دریافت کرده اند و کارکنان مراقبت سلامت می باشند .

دوره کمون متغیر بوده و ممکن است بین ۱۵ تا ۱۶۰ روز باشد .

تظاهرات بالینی :

علائم معمولاً خفیف است . اما غالباً وضعیت ناقل مزمن بودن رخ می دهد و خطر بیماری مزمن کبد شامل سیروز یا سرطان کبد ، پس از هپاتیت C افزایش می یابد ، مصرف الکل باعث پیشرفت این بیماری می شود .



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی درمانی خلیلی

هیپاتیت

کد سند: f-1/3/3-67

واحد آموزش سلامت

۱۴۰۲

هیپاتیت سمی

در شروع بیماری ، هیپاتیت سمی مشابه هیپاتیت ویروسی است . گرفتن تاریخچه مواجهه با مواد شیمیایی ، داروها ، عوامل گیاهی یا سایر مواد سمی هیپاتوتوکسیک (سم زا در کبد) در درمان و حذف عامل ایجاد کننده ، کمک کننده است .

تظاهرات بالینی :

بی اشتهاپی ، تهوع و استفراغ علائم شایع هستند ، زردی و کبد بزرگ در ارزیابی جسمی ملاحظه می شوند . علائم در بیمارانی که به شدت سمی شده اند ، شدیدتر است .

هیپاتیت ناشی از دارو

بیماری کبدی ناشی از دارو ، شایع ترین علت نارسایی حاد کبدی است .

تظاهرات بالینی :

معمولاً شروع ناگهانی همراه با لرز ، تب ، ضایعات پوستی ، خارش ، التهاب مفاصل ، بی اشتهاپی و تهوع دارد . سپس ممکن است زردی ، ادرار تیره رنگ و بزرگی و حساسیت کبد در لمس وجود داشته باشد .

منبع :

– م . حیدری . پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳ بروزر و سودارت . ترجمه : ب . روز بهان ، م . زندی ، م . نیکروان مفرد ، ف . داودآبادی ، م . شالی ، م . عبدی ، م . موسوی سرچشمه . چاپ نخست . انتشارات حیدری . ۲۰۱۸ .

– بازنگری : ۱۴۰۲

هیپاتیت ویروسی D

عنوان ویروس هیپاتیت D در بعضی از موارد هیپاتیت B دیده می شود . از جایی که ویروس به آنتی ژن سطحی هیپاتیت B جهت تکثیر نیاز دارد ، تنها افرادی که هیپاتیت B دارند ، در معرض خطر هیپاتیت D هستند . این نوع هیپاتیت در بین مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی و وریدی ، بیماران همودیالیزی و یا افرادی که نیاز به تزریق خون مکرر دارند شایع است . تماس جنسی با افرادی که هیپاتیت B دارند ، به عنوان شیوه مهم انتقال هیپاتیت B و D شناخته شده است . دوره نقاهت بین ۳۰ تا ۱۵۰ روز متغیر است .

تظاهرات بالینی :

علائم هیپاتیت D مشابه هیپاتیت B است ، بجز این که بیماران در معرض احتمال ایجاد نارسایی کبدی برق آسا و پیشرفت به سمت هیپاتیت مزمن فعال و سیروز هستند .

هیپاتیت ویروسی E

این نوع هیپاتیت از راه مدفوعی-دهانی عمدتاً از راه آب آلوده منتقل می شود . دوره نقاهت متفاوت ، بین ۱۵ تا ۶۵ روز برآورد می شود .

تظاهرات بالینی :

عمدتاً هیپاتیت E شبیه هیپاتیت A میباشد . یک دوره محدود با شیوع ناگهانی دارد . زردی تقریباً همیشه وجود دارد . حالت مزمن ایجاد نمی شود . هیپاتیت غیر ویروسی شامل هیپاتیت سمی و هیپاتیت ناشی از دارو میباشد .