

گوش درد :

گوش درد می تواند بطور اولیه در همان ارگان (اختلال در گوش) مثل عفونت یا از جای دیگری منشأ گرفته باشد .
(اختلالات خارج گوش) گوش درد می تواند نتیجه عفونت در گوش خارجی یا میانی و یا صدمه به گوش و سر باشد .

گوش درد ارجاع شده از مکانهای دیگر می تواند توسط اختلالات در مفصل فک گیجگاهی ، اعصاب مغزی ، صورت ، پوست سر ، حلق و لوزه ها ، تیروئید ، نای ، دندان و یا عضلات گردن بوجود آید .

علت :

گوش درد می تواند بعلت عفونت در گوش خارجی و میانی ایجاد شود . آلودگی های باکتریایی می تواند از طریق مواد

زائد آلوده وارد گوش شود . بعنوان مثال انگشتان یا اجسام .

ورود اجسام تیز به گوش می تواند پوست را مصدوم کرده و

راه بازی را برای عفونت تأمین کند . تزریق یا ورود محلولهای

آلوده به گوش عفونت و التهاب را افزایش می دهد . ابتلا

بیماران به عفونت های تنفسی فوقانی ، عملکرد نامناسب

شیبور استاش و آلرژی ها نیز خطر عفونت های گوش را

افزایش می دهد .

عفونتها و بدخیمی های حلق نیز می تواند باعث گوش درد

ارجاعی شود .

برای بیماران مبتلا به عفونتهای حاد لوزه ، گوش درد غیر

معمول نیست ولو اینکه گوشها در معاینه نرمال باشند .

انسداد حاد ناشی از تغییرات ارتفاع که بعلت پرواز یا زیر

آب رفتن ایجاد می شود ، می تواند باعث اختلالات گوش

میانی گردد .

درمانهای اکسیژن پرفشار نیز می تواند باعث ایجاد آسیب

ناشی از فشار شود . مثلاً در مسمومیت با منوکسید کربن .

درد نواحی فک ، گیجگاهی ، لته و دندان ، دهان و ماهیچه

گردن می تواند باعث ارجاع درد به گوش شود .

درد مفصل بعلت سائیدن دندانها بهم ، جویدن و زیاد حرف

زدن بوجود می آید و التهاب این مفصل برای بیمار به

صورت درد گوش احساس می شود .

استرس و فشار روی ماهیچه های گردن می تواند به گوش

منتقل شود .



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز آموزشی درمانی خلیلی

گوش درد

کد سند : f-1/3/3-56

واحد آموزش سلامت

۱۴۰۲

مداخلات پزشکی شامل :

- بهبودی (شستشوی گوش و مصرف آنتی بیوتیکها)
- تسکین درد
- برگرداندن عملکرد طبیعی گوشها



منابع :

- س . اسملترز . پرستاری داخلی و جراحی برونر و سو دارث . ترجمه : م . ایمانی پور . چاپ نخست . انتشارات اندیشه رفیع . ۲۰۱۰
- بازبینی توسط اساتید گوش ، حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی خلیلی
- بازنگری : ۱۴۰۲

عوامل ایجاد درد گوش :

- صدمه به گوش خارجی مانند بریدگیها ، صدمه غیر نافذ ، سوختگی ، سرمازدگی .
- ورود اجسام خارجی : که گوش درد ناشی از انسداد در کانال گوش و ایجاد فشار است که ممکن است فرد احساس کاهش شنوایی ، احساس پری و خارش در گوش داشته باشد .
- اختلالات شیپور اوستاش .
- عفونتها که شامل عفونتهای گوش خارجی ، عفونتهای گوش میانی ، عفونت پرده گوش و عفونت استخوان مستوئید (پشت گوش) می باشد .
- وجود توده ها در کانال گوش خارجی مانند کیستها ، آبسه و توده های بدخیم .